

DOPUNA REGISTRA LEKOVA

2013



Novi lekovi

- M04AA03 **Adenuric**, Menarini Group antiurik
(*febuksostat*)
- Adenuric 80** film tabl. 28 i 56 x 80mg
Adenuric 120 film tabl. 28 i 56 x 120mg
upotreba lek se uzima nezavisno od jela
samo odrasli: 1 x 80mg a ako je serumska vrednost mokraćne kiseline iznad 6mg/dl
(357µmol/L) posle 2 - 4 nedelje može se primeniti 1 x 120mg
- L02BG03 **Altravesa**, Cell Pharm citostatik - inhibitor
Altravesa, Haupt Pharma Munster enzima aromataze
Altravesa, Siegfried Generics
Altravesa, Stada
(*anastrozol*)
- film tabl. 28 x 1mg
upotreba uznapredovali karcinom dojke kod žena u postmenopauzi: 1mg dnevno
paralele Anastrozol Pliva, Anastrozole Medico Uno, Anazol, Aremed, Arimidex,
Armotraz, Mivisia, Trasolette
- B05BA01 (SZ) **Aminoven infant 10%**, Fresenius Kabi parenteralni
(*aminokiseline*) nutritiv
- rastvor za inf. 10 x 100ml
upotreba primenjivati kao kontinuiranu intravensku infuziju putem centralne vene, Max.
brzina infuzije do 0,1g (1ml) aminokiseline/kg/sat
deca 1 godina: 1,5 - 2,5g (15 - 25ml)/kg
2 - 5 godina: 1,5g (15ml)/kg
6 - 14 godina: 1g (10ml)/kg
- B03XA01 (SZR) **Binocrit**, Sandoz Austrija stimulator eritropoeze
(*epoetin alfa - humani rekombinantni eritropoetin*)
- rastvor za inj. (špric) sc iv 6 x 2000ij/ml
rastvor za inj. (špric) sc iv 6 x 3000ij/0,3ml
rastvor za inj. (špric) sc iv 6 x 4000ij/0,4ml
rastvor za inj. (špric) sc iv 1 x 20 000ij/0,5ml
rastvor za inj. (špric) sc iv 1 x 30 000ij/0,75ml
rastvor za inj. (špric) sc iv 1 x 40 000ij/ml
upotreba doziranje je individualno i zavisi od indikacije; supkutane doze su 20 - 30%
niže od intravenskih
paralele Eprex

N03AX14

Cetalev, Zdravlje Medic

antiepileptik

△ (levetiracetam)

film tabl. 30 i 60 x 250mg, 500mg i 1000mg

upotreba

monoterapija - odrasli i adolescenti iznad 16 godina: 2 x 250mg (početno), povećati do inicijalne terapijske doze 2 x 500mg posle

2 nedelje, po potrebi doza može da se povećava za 2 x 250mg svake

2 nedelje, Max. dnevna doza 2 x 1500mg

dodatna terapija - odrasli i deca iznad 12 godina teža od 50kg:

2 x 500mg (početno), po potrebi doza se može povećavati na

2 - 4 nedelje za 2 x 500mg, Max. 1,5g dnevno

- deca 4 - 18 godina lakša od 50kg: 2 x 10mg/kg (početno), po potrebi doza se može povećavati na 2 nedelje za 2 x 10mg/kg,

Max. 2 x 30mg/kg

paralele Epilev, Keppra, Tinalvo

N06DA02

Cipozel, Pliva Hrvatska

terapija Alzheimer-ove bolesti

Cipozel, Teva Mađarska

(donepezil hlolid)

oralna disperzibilna tabl. 28 x 5mg i 10mg

upotreba *disperzibilna (raspadljiva) tabl. se drži pod jezikom dok se ne raspadne, a zatim se proguta sa ili bez vode*

5mg dnevno, odjednom, tokom 4 - 6 nedelja, zatim povećati na 10mg dnevno, odjednom, Max. 10mg dnevno

paralele Aricept, Aricept evess, Donecept, Donepezil Alvogen, Landex, Palixid, Tregona, Yasnal

L01XA01 (SZ)

Cisplatin, Medac

citostatik - alkilirajući agens

(cisplatin)

rastvor za inf. 1 x (0,5mg/ml) 20ml i 100ml

upotreba *monoterapija - odrasli i deca: 50 - 100mg/m² dnevno, jednom na 3 - 4 nedelje ili 20mg/m² dnevno, tokom 5 dana na 3 - 4 nedelje*

paralele Cisplatin "Ebewe", Cisplatin PharmaSwiss, Cisplatin-Teva, Platinex, Platosin, Sinplatin

D10AF01

Clinda Topic, Weimer Pharma

antibiotik

(klindamicin)

rastvor za kožu (1%) 30ml i 100ml

upotreba *2 x dnevno naneti tanak sloj na lice i druge delove kože sa aknama*

paralele Clindasome

B02BX11

Dicynone, Lek

antihemoragik

(etamsilat)

(Rp) tabl. 30 x 250mg

(Z) rastvor za inj. im iv 10 x 250mg/2ml

upotreba oralno lek se uzima uz jelo

oralno ili parenteralno - preoperativno: 250 - 500mg 1 sat pre intervencije

- postoperativno: 250 - 500mg na 4 - 6 sati sve dok postoji rizik od hemoragije

oralno - meno ili metroragija: 3 x 500mg tokom 10 dana

G04BE03

Dinamico, Pliva Hrvatska

terapija erektilne disfunkcije

(sildenafilil)

film tabl. 4 x 50mg i 100mg

upotreba 50 - 100mg, 1 sat pre seksualnog odnosa (uzima se najviše jedna doza dnevno)

paralele Ernafil, Gedena, Menagra, Sildena, Sildenafilil Sandoz, Viagra, Vizarsin

N06AB10

Escitalopram Sandoz, Salutas

antidepresiv

(escitalopram)

film tabl. 30 x 10mg i 20mg

upotreba tablete se mogu deliti, uzima se u pojedinačnoj dnevnoj dozi, nezavisno od hrane

depresija, anksiozni poremećaji (socijalni i generalizovani), opsesivno kompulzivni poremećaj: 1 x 10mg, po potrebi povećati do Max. 20mg dnevno

panični poremećaji sa agorafobijom ili bez nje: 5mg (početna doza) tokom 7 dana, zatim 10mg dnevno, Max. 20mg dnevno

paralele Alvocital, Cipralex, Citram, Elicea, Efram, Lata

B03AC02 (SZ)

Ferrum Sandoz, Salutas

antianemik

(gvožđe (III)-hidroksid saharoza kompleks)

koncentrat za rastvor za inj./inf. 5 x 100mg/5ml

upotreba primenjuje se isključivo sporom iv inj. ili infuzijom kap po kap

doziranje treba da bude prilagođeno svakom bolesniku posebno, a bazira se na praćenju ukupnog deficita gvožđa

paralele Ferrovin, Trioferrum

J02AC01	Flukonazol , Replek Farm (<i>flukonazol</i>)	<i>antimikotik</i>
	kaps. tvrda 7 x 50mg	
	upotreba	
	<i>odrasli: 50 - 100mg dnevno, 7 - 14 dana (oralna kandidijaza); 150mg nedeljno ili 50mg dnevno, 2-4 nedelje (dermatomikoze); 150mg jednokratno (vaginalna kandidijaza i balanitis); 50 - 400mg dnevno (prevencija kamidijaze); 200 - 400mg dnevno (sistemska kandidijaza)</i>	
	<i>deca: 3 - 6mg/kg dnevno prvog dana, zatim 3mg/kg dnevno (mukozna kandidijaza); 6 - 12mg/kg dnevno (sistemska kandidijaza)</i>	
	paralele Diflucan, Fluco Sandoz, Fluconal, Fluconazole Teva	
A10BH02	Galvus , Novartis Pharma Stein Švajcarska (<i>vildagliptin</i>)	<i>oralni antidijabetik</i>
	tabl. 28 x 50mg	
	upotreba	
	<i>• 2 x 50mg (ujutro i uveče) u kombinaciji sa metforminom ili lekovima iz grupe tiazolidina • 50mg ujutro u kombinaciji sa sulfonilurjom</i>	
A10BX02	Glukoglinid , Actavis Malta (<i>repaglinid</i>)	<i>oralni antidijabetik</i>
	tabl. 90 x 0,5mg, 1mg, 2mg i 4mg	
	upotreba	
	<i>1 x 0,5mg početno, po potrebi povećavati u intervalima 1 - 2 nedelje do najviše 4mg uz glavne obroke, Max. 16mg dnevno</i>	
	paralele Enyglid, Reguly	
A10BG03	Glukoglitazon , Actavis Malta (<i>pioglitazon</i>)	<i>oralni antidijabetik</i>
	tabl. 30 x 15mg, 30mg i 45mg	
	upotreba	
	<i>odrasli iznad 18 godina: 1 x 15 - 30mg, po potrebi povećati do 45mg</i>	
	paralele Oglition	
M01AE01 (BR)	Ibalgin Rapid , Zentiva (<i>ibuprofen</i>)	<i>nesteroidni antireumatik</i>
	film tabl. 6 i 12 x 400mg	
	upotreba <i>uzima se posle jela u najmanjem intervalu od 4 sata između 2 doze odrasli deca iznad 12 godina: 400 - 1200mg dnevno</i>	
	paralele Brufen, Ibalgin 400, Ibalgin Baby, Ibudolor, Ibuprofen, Rapidol, Rapidol S, Spedifen	

J05AE11 (SZR) **Incivo**, Janssen-Cilag *antivirotik za hepatitis C*
(telaprevir)
film tabl. 168 x 375mg
upotreba terapiju započinje i vodi lekar sa iskustvom u lečenju hroničnog hepatitisa C
odrasli iznad 18 godina: 750mg na 8 sati uz jelo u kombinaciji sa ribavirinom i
peginterferonom alfa

C07AG02 **Karvedilol**, Replek Farm *beta blokator*
(karvedilol)
tabl. 30 x 12,5mg i 25mg
upotreba
hipertenzija: 12,5mg početno, zatim 25mg dnevno, Max. 50mg dnevno
angina pectoris: 12,5mg početno, zatim 2 x 25mg, Max. 50mg dnevno podeljeno u 2 doze
hronična insuficijencija miokarda: 2 x 3,125mg (2 nedelje), zatim 2 x 6,25mg (2 nedelje),
nastaviti sa 2 x 12,5mg, Max. 2 x 25 - 50mg
paralele Carvedigamma, Carvedilol Sandoz, Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Karvileks,
Milenol

C09DA01 **Lakea Plus**, Lek *antihipertenziv*
(losartan kalijum + hidrohlorotiazid)
film tabl. 30 x (50mg + 12,5mg) i (100mg + 25mg)
upotreba 1 tabl. dnevno
paralele Erynorm plus, Lorista H, Lorista HD, Losar plus, Losartic plus

▲ (*lamotrigin*)

tabl. 30 x 25mg, 50mg i 100mg

upotreba**epilepsija (odrasli i deca iznad 12 godina)**

- monoterapija: 25mg dnevno prvih 14 dana, 50mg dnevno narednih 14 - 30 dana, postepeno povećavati do optimalne doze održavanja 2 x 100 - 200mg
- kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan prvih 14 dana, 25mg dnevno narednih 14 dana, postepeno povećavati za 25 - 50mg nedeljno, do optimalne doze održavanja 100 - 200mg dnevno u 1 ili 2 doze
- kombinovana terapija bez valproata: 0,6mg/kg/dan podeljeno u 2 doze prvih 14 dana, povećati na 1,2mg/kg/dan narednih 14 dana do optimalne doze održavanja 5 - 15mg/kg/dan u 1 ili 2 doze

epilepsija (deca 2 - 12 godina) - monoterapija ili kombinovana sa valproatom:

1 x 0,15mg/kg prvih 14 dana, zatim 1 x 0,3mg/kg još 14 dana, po potrebi dozu povećavati za 0,3mg/kg nedeljno do uobičajene doze 1 - 5mg/kg u 1 ili podeljeno u 2 doze

bipolarni afektivni poremećaji (samo odrasli)

- monoterapija: 25mg dnevno (početno), povećavati za 50mg tokom 5 nedelja do doze održavanja 100 - 400mg dnevno u 1 ili 2 doze
- kombinovana terapija sa valproatom: 25mg na drugi dan tokom 14 dana, zatim 25mg narednih 14 dana, u 5-oj nedelji 50mg dnevno, optimalna doza 100mg dnevno u 1 ili podeljeno u 2 doze, Max. 200mg dnevno
- kombinovana terapija sa antiepilepticima bez valproata: 50mg dnevno 14 dana, zatim 2 x 25mg 14 dana, zatim u 5-oj nedelji 2 x 100mg, u 6-oj nedelji 2 x 150mg do optimalne doze 2 x 200mg

paralele Epiritrigine, Lamal, Lamect, Lameptil, Lamictal, Lamotral, Lamotrix, Solaban*(latanoprost)*

kapi za oči, rastvor 1 x (50µg/ml) 2,5ml

upotreba čuvati na 2 - 8°C

1 kap uveče u obolelo oko

paralele Latanox, Lataz, Unilat, Xalatan

A02BC03

Lazol, Farmal

inhibitor protonске pumpe

(lansoprazol)

gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 15mg

gastrorezistentna kaps. tvrda 14 i 28 x 30mg

upotreba uzima se 30 minuta pre obroka

ulkus: 1 x 30mg tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma) ili 8 nedelja (ulkus želuca)

refluksni ezofagitis: 1 x 30mg tokom 8 nedelja

Zolinger Ellisonov sindrom: do 180mg dnevno odjednom ili podeljeno u 2 doze

paralele Lansoprazol ICP, Lanzul, Larona, Sabax

G02BA03 (Z)

Levosert, Gedeon Richter

lokalni kontraceptiv

(levonorgestrel)

intrauterini dostavni sistem 1 x 20µg/24 sata

upotreba intrauterini dostavni sistem ugrađuje se u matericu, gde se levonorgestrel

postepeno oslobađa (20µg dnevno tokom 5 godina)

paralele Mirena

C09CA01

Losartan, Replek Farm

antihipertenziv

(losartan kalijum)

film tabl. 30 x 50mg

upotreba

1 x 50mg, po potrebi posle 4 nedelje povećati na 100mg dnevno

paralele Cozaar, Erynorm, Lakea, Lorista, Losar, Losarin, Losartic, Lotar, LozarEP, Rasoltan

J07AH08 (Z)

Menactra, Sanofi Pasteur

vakcina protiv meningitisa

(vakcina protiv meningitisa (serotip A, C, Y i W-135), poli)

rastvor za inj. im 1 i 5 x (4µg +4µg + 4µg + 4µg)/0,5ml

upotreba deca iznad 2 godine i odrasli do 55 godina: 0,5ml duboko im jednokratno

L04AA06 (SZR)

Mofetan, PharmaSwiss

imunosupresiv

(mikofenolna kiselina)

kaps. tvrda 30 x 250mg

film tabl. 150 x 500mg

upotreba Mofetan primenjivati zajedno sa ciklosporinom i kortikosteroidima

profilaksa odbacivanja organa: 2 x 1g (inicijalnu dozu dati 24 sata po transplantaciji)

suzbijanje započetog odbacivanja transplantata: 2 x 1,5g

paralele CellCept, Micolat, Mycophenolate Mofetil Medico Uno, Myfortic, Trixin

J01MA14

Movoxan, Zdravlje Medic
(moksifloksacin hlorid)

hinolonski antibiotik

film tabl. 5, 7 i 10 x 400mg

upotreba

odrasli: 400mg dnevno

paralele Avelox

A02BC02

Nolpaza, Pharmanova
(pantoprazol)

inhibitor protonске pumpe

gastrorezistentna tabl. 14 i 28 x 20mg i 40mg

upotreba primenjuje se najduže 8 nedelja neprekidno, i uzima se 30 minuta pre doručka

ulkus: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 2 nedelje (ulkus duodenuma), ili 4 nedelja (ulkus želuca)

refluksni ezofagitis: 40mg (izuzetno 80mg) tokom 4 nedelje

paralele Apazol, Controloc, Gastroloc, Panrazol, Pantoprazol Farnoz, Pantoprazol PharmaS, Pantoprazol Sandoz, Pulcet, Zeladrol, Zoltex

N05AH03

Olanzapin, Replek Farm
▲(olanzapin)

antipsihotik

film tabl. 30 x 5mg i 10mg

upotreba odrasli: 1 x 10mg (početna doza), zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili povećati do Max. 20mg

paralele OlanzEP, Olanzapin PharmaS, Olanzapin Sandoz, Olanzapin-Teva, Onzapin, Sizap, Treana, Vaira-V, Zalasta, Zapilex, Zyprexa Velotab

C01DA14

Olicard, Temmler Pharma
(izosorbid mononitrat)

antianginalgik

kaps. tvrda sa produženim oslobađanjem 50 x 40mg i 60mg

upotreba lek se uzima ujutro na prazan stomak sa vodom uvek u isto vreme

profilaksa napada angine pektoris: 1 x 40 - 60mg, po potrebi doza se može povećati na 1 x 120mg

paralele Isocard

C10AX06

Omacor, Abbott Nemačka
Omacor, Pronova Biopharma Norge
(omega-3-kiselina etil estri 90)

hipolipemik

kaps. meka 28 x 1000mg

upotreba lek se može uzimati sa hranom

hipertrigliceridemija: 2000 - 4000mg dnevno

sekundarna prevencija nakon infarkta: 1000mg dnevno

A02BC01

Omeprazol, Hemofarm

inhibitor protonске pumpe

(omeprazol)

gastrorezistentna kaps. tvrda 14 i 15 x 20mg

upotreba

ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca)

refluksni ezofagitis: 20mg ujutro tokom 4 - 8 nedelja

Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), 20 - 120mg dnevno (doza održavanja)

paralele Loseprazol, Omeprazid, Omeprazol ICP, Omeprol, Omex, Ortalox, Ortanol, Zeprom

L01XA03 (SZ)

(oksaliplatin)

citostatik - alkilirajući agens

Oxaliplatin HF, Cell Pharm

prašak za rastvor za inf. 1 x 50mg i 100mg

Oxaliplatin LYO, Fresenius Kabi

prašak za rastvor za inf. 1 x 50mg i 100mg

upotreba

85mg/m² jednom u 2 nedelje, ili 130mg/m² jednom u tri nedelje

paralele Eloxatin, Eloxatine, Oxaliplatin "Ebewe", Oxaliplatin PharmaSwiss, Oxaliplatin-Pliva, Sinoxal

C09BA05

Prilinda plus, Lek

antihipertenziv

(ramipril + hidrohlorotiazid)

tabl. 28 x (5mg + 25mg)

upotreba *1 tabl. dnevno (najbolje ujutru), po potrebi dozu povećati najviše do 2 tablete dnevno*

paralele Ampril HD, Ampril HL, Piramil HCT, Ramicomp Genericon, Ramipril H, Tritace comp, Vivace Plus

C09AA04

Relika, Alkaloid Beograd

ACE inhibitor

(perindopril)

tabl. 30 x 2mg, 4mg i 8mg

upotreba *lek se uzima pre doručka*

1 x 2mg (početna doza), 1 x 4mg (doza održavanja), Max. 10mg dnevno

paralele Nopritex, Perigard, Prenessa, Prexanil, Ranbapril

N02BE51 (BR)

Rhinostop, Bosnalijek

terapija nazeba

(paracetamol + pseudoefedrin + hlorfenamin)

tabl. 10 x (251mg + 61,2mg + 2,54mg)

upotreba *odrasli i deca iznad 12 godina: 1 tabl. na 6 sati*

C10AA07

(rosuvastatin)

hipolipemik

Rosucard, Zentiva

film tabl. 30 x 10mg, 20mg i 40mg

Rosuvastatin Sandoz, Lek

film tabl. 28 x 5mg, 10mg, 20mg i 40mg

upotreba 1 x 5 - 10mg (početno), po potrebi povećavati u intervalima, ne kraćim, od 4 nedelje do 1 x 20mg, izuzetno kod visokog kardiovaskularnog rizika pod nadzorom specijaliste povećavati na 1 x 40mg

paralele Crestor, Rosuhol, Roswera, Rovesta, Roxera

B05BA02 (SZ)

SMOFLipid, Fresenius Kabi

parenteralni nutritiv

(prečišćeno sojino ulje + trigliceridi srednje dužine lanca + prečišćeno maslinovo ulje + riblje ulje bogato omega 3 kiselinama)

emulzija za inf. 10 x (60g + 60g + 50g + 30g)/L 100ml, 250ml i 500ml

upotreba doziranje je individualno

V03AF06 (SZ)

Sodiofolin, Medac

antidot

(dinatrijum folinat)

rastvor za inj./inf. 1 x (100mg/2ml), (200mg/4ml), (300mg/6ml), (350mg/7ml) i (400mg/8ml)

upotreba

prevencija intoksikacije metotreksata: primenjuju se u periodu od 8 do 72 sata od početka iv primene metotreksatom

kombinacija sa 5-fluorouracilom u terapiji citostaticima: doziranje je prema protokolu, a sprovodi ga lekar sa iskustvom u primeni (ne postoje podaci o primeni ove kombinacije kod dece)

N05AH05

Sycrest, Organon Irska

antipsihotik

(asenapin)

sublingvalna tabl. 60 x 5mg i 10mg

upotreba primenjuje se kod odraslih

monoterapija: 2 x 10mg (početno), po potrebi dozu smanjiti na 2 x 5mg

kombinovana terapija: 2 x 5mg (početno), po potrebi dozu povećati na 2 x 10mg

R03DC03

Teluka, Galenika

antiastrmatik

(montelukast)

tabl. za ųvakanje 28 x 4mg i 5mg

film tabl. 28 x 10mg

upotreba lek se uzima uveče pre spavanja, 1 sat pre ili 2 sata posle jela

odrasli i deca iznad 15 godina: 10mg (progutati celu tabl.)

deca 6 meseci - 6 godina: 4mg (tabl. za ųvakanje)

deca 6 - 14 godina: 5mg (tabl. za ųvakanje)

paralele Alvokast, Monkasta, Monlast, MontEP, Montelukast PharmaS, Singulair

C10AA05

Torez, Alkaloid Beograd

hipolipemik

(atorvastatin)

film tabl. 30 x 10mg, 20mg, 40mg i 80mg

upotreba 10mg uveče, po potrebi dozu postepeno povećavati u intervalima od

4 nedelje do 40mg dnevno, Max. 80mg dnevno

paralele Atacor, Atolip, Atoris, Atorvastatin PharmaS, Dislipat, Hipolip, Lipidra, Sortis, Tulip

N03AX21

Trobalt, Glaxo Wellcome Španija

antiepileptik

(retigabin)

film tabl. 21 i 84 x 50mg i 100mg

film tabl. 84 x 200mg, 300mg i 400mg

upotreba 3 x 100mg (početno), zatim se ukupna dnevna doza po potrebi povećava za

Max. 150mg svake nedelje, efektivna doza održavanja je 600 - 1200mg

dnevno, Max. 1200mg dnevno

L01XX19 (SZ)

Viaritec, Vianex

citostatik

(irinotekan hlorid trihidrat)

koncentrat za rastvor za inf. 1 x 40mg/2ml i 100mg/5ml

upotreba 350mg/m² infuzijom tokom 30 - 90 minuta, svake 3 nedelje

paralele Campto, Irinotecan, Irinotecan Ebewe, Irinotecan PharmaSwiss, Irinotesin

N05AX13 (SZR)

Xeplion, Janssen Pharmaceutica

antipsihotik

▲ (paliperidon)

suspenzija za inj. sa produženim oslobađanjem (špric) 1 x 25mg/0,25ml,

50mg/0,5ml, 75mg/0,75ml, 100mg/ml i 150mg/1,5ml

upotreba

šizofrenija - odrasli koji su stabilizovani oralnim risperidonom ili paliperidonom: 150mg

početno, zatim 8-og dana još 100mg (za brzo

postizanje terapijske koncentracije)

terapija održavanja: 1 x mesečno 25mg - 150mg u zavisnosti od individualnog odgovora

L01XE15

Zelboraf, Roche
(vemurafenib)

citostatik - inhibitor protein kinaze

film tabl. 56 x 240mg

upotreba preporučena doza: na 12 sati 960mg nezavisno od jela

NOVI OBLICI, DOZE I PAKOVANJA

A03DA02

△ **Baralgetas**, Jugoremedija
(metamizol natrijum + pitofenon + fempiverinijum)

spazmolitik

supozitorija 5 x (1000mg + 10mg + 0,1mg) **NOVI OBLIK**

upotreba 1 - 4 x 1 supzitorija u najkraćem razmaku od 6 sati između 2 doze,
Max. 4 supozitorije dnevno

M01AE01

Brufen, Abbott Italija
(ibuprofen)

nesteroidni antireumatik

šumeće granule 30 x 600mg

NOVI OBLIK

upotreba šumeće granule rastvoriti u čaši vode

odrasli i deca iznad 12 godina: 0,6 – 1,2g dnevno, Max. 2,4g dnevno

juvenilni reumatoidni artritis: 40mg/kg/dan podeljeno u više doza uzima se posle jela

paralele Ibalgin 400, Ibalgin Baby, Ibalgin Rapid, Ibudolor, Ibuprofen, Rapidol,
Rapidol S, Spedifen

B02BD06 (SZR)

Immunate, Baxter Austrija
(koagulacioni faktor VIII - humani + von Willebrand-ov faktor)

hemostatik

prašak i rastvarač za rastvor za inj. iv 1 x (250ij + 190ij)/5ml

NOVA DOZA

prašak i rastvarač za rastvor za inj. iv 1 x (500ij + 375ij)/5ml

prašak i rastvarač za rastvor za inj. iv 1 x (1000ij + 750ij)/10ml

upotreba

hemofilija A: doziranje je individualno i zavisno od stepena nedostatka faktora VIII,

stepena krvarenja, vrste hirurške intervencije i od opšteg stanja bolesnika

Willebrand-ova bolest: 40 - 80ij/kg von Willebrand-ovog faktora i

20 - 40ij/kg faktora VIII

izračunavanje doze faktora VIII bazira se na činjenici da 1ij faktora VIII/kg telesne mase

povećava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2% od normalne aktivnosti

paralele Haemate P, Wilate

- A10BG03 **Oglition**, Zdravlje oralni antodijabetik
(*pioglitazon*)
tabl. 30 x 15mg, 30mg i 45mg **NOVO PAKOVANJE**
- V08AB07 (SZ) **Optiray**, Tyco Healthcare *Rö kontrast*
(*joversol*)
Optiray 300 rastvor za inj. (300mg joda/ml) 10 x 50ml, 75ml, 100ml, 150ml, i 200ml
rastvor za inj. (300mg joda/ml) 5 x 500ml **NOVO PAKOVANJE**
Optiray 350 rastvor za inj. (350mg joda/ml) 10 x 50ml, 100ml i 200ml
rastvor za inj. (350mg joda/ml) 5 x 500ml
- N05AX08 **Rispen**, Farnal *antipsihotik*
▲ (*risperidon*)
film tabl. 60 x 1mg **NOVA DOZA**
upotreba uobičajeno doziranje: 2 x 2 - 4mg, Max. 2 x 8mg
paralele Risperidon, Rispolept, Rispolept Consta, Rispolux, Rissar, Risset, Speridan,
Torendo, Torendo Q-TAB
- B05XA03 (Z) **Sodium chloride 0,9%**, B. Braun *nadoknada tečnosti*
(*natrijum hlorid*) *i elektrolita*
rastvor za inf. 10 x (0,9%) 250ml (308mOsm/L) **NOVO PAKOVANJE**
- A01AD02 (BR) **Tantum**, A.C.R.A.F. *antiinflamatorno sredstvo*
(*benzidamin hlorid*)
Tantum Verde Forte sprej za usnu sluznicu (3mg/ml) 15ml **NOVA DOZA**
upotreba
odrasli: prskati obolelo mesto 2 - 6 x dnevno (na 1,5 - 3 sata)
- N07CA01 **Urutal**, Belupo *terapija vertiga*
(*betahistin hlorid*)
tabl. 100 x 8mg **NOVA DOZA**
upotreba lek se uzima uz jelo
3 x 8 - 16mg
terapija održavanja: 24 - 48mg dnevno
paralele Acuver, Betaserc, Vestibo

C08DA01 (SZ) **Verapamil Alkaloid**, Alkaloid *antagonist Ca²⁺*
(*verapamil hlorid*)

rastvor za inj./inf. 10 x 5mg/2ml

NOVI OBLIK

upotreba

odrasli: 5mg inicijalno polako, preko 2 minuta, po potrebi nakon 5 - 10 minuta još 5mg, za održavanja postignutog efekta dati infuziono 5 - 10mg/sat do ukupne doze od 100mg/dan

deca - novorođenčad: 0,75 - 1mg (0,3 - 0,4ml)

- odojčad: 0,75 - 2mg (0,3 - 0,8ml)

- 1 - 5 godina: 2 - 3mg (0,8 - 1,2ml)

- 6 - 14 godina: 2,5 - 5mg (1 - 2ml)

B05AA07 (SZ) **Voluven**, Fresenius Kabi *nadoknada tečnosti i elektrolita*
(*hidroksietilskrob 130/0,4 + natrijum hlorid*)

rastvor za inf. (6% + 0,9%) 20 i 30 x 250ml

NOVO PAKOVANJE

rastvor za inf. (6% + 0,9%) 10 i 20 x 500ml

NOVI PROIZVOĐAČ

J01GB01 (SZR) **Bramitob**, Genetic Italija *antibiotik*
(*tobramicin*)

rastvor za raspršivanje 56 x 300mg/4ml

upotreba *deca iznad 6 godina i odrasli: 300mg inhalacijom na 12 sati, tokom 28 dana*

R01BA53 (BR) **Coldrex**, S.C. Europharm *terapija nazeba*
(*paracetamol + fenilefrin hlorid + kofein + terpin hidrat + askorbinska kiselina*)

tabl. 12 i 24 x (500mg + 5mg + 25mg + 20mg + 30mg)

upotreba *odrasli i deca iznad 12 godina: 4 x 1 - 2 tabl. Max. 8 tableta dnevno*

G03DA04 **Crinone**, Central Pharma *gestagen*
(*progesteron*)

vaginalni gel 8% (u aplikatoru) 15 x 90mg/1,125g

upotreba

1 aplikator dnevno posle ovulacije ili od 18 do 21 dana menstrualnog ciklusa

1 aplikator dnevno nakon in vitro fertilizacije i potvrde trudnoće, tokom 30 dana kontinuirano

- D11AH02 **Elidel**, MEDA Pharma dermatik
(pimekrolimus)
krem (1%) 15g
upotreba odrasli deca iznad 2 godine: 2 x dnevno mazati obolelo mesto do nestanka simptoma
- A10BF01 **Glucobay**, Bayer HealthCare oralni antidijabetik
(akarboza)
tabl. 30 x 50mg i 100mg
upotreba uzima se neposredno pre jela ili sa prvim zalogajima hrane 50mg dnevno (početno), povećati na 3 x 50mg, po potrebi posle 6 - 8 nedelja povećati na 3 x 100mg, Max. 600mg dnevno
- D01BA02 **Lamisil**, Novartis Pharma Produktions Nemačka antimikotik
(terbinafin)
tabl. 14 x 250mg
upotreba 250mg dnevno (odrasli i deca iznad 40kg), 125mg dnevno (deca 20 - 40kg), 62,5mg dnevno (deca ispod 20kg)
trajanje terapije: 2 - 6 nedelja (tinea pedis) 2 - 4 nedelje (tinea corporis i cruris), 2 - 4 nedelje (kožna kandidijaza), 6 - 12 nedelja i duže (onihomikoze)
paralele Mycofin, Myconafine, Terbinafin Genericon
- J01MA12 **Levoxa**, Zdravlje hinolonski antibiotik
△ (levofloksacin)
film tabl. 5, 7 i 10 x 250mg i 500mg
upotreba 250 - 500mg na 12 sati
paralele Flexid, Forteca, Lebel, Leflogal, Levomax, Levoxa, Lofocin
- M01AC06 **Movalis**, Boehringer Ingelheim Nemačka nesteroidni antireumatik
(meloksikam)
tabl. 20 x 15mg
upotreba oralno: 1 x 15mg
paralele Loartroxy, Lormed, Melogal, Meloksikam PharmaS, Melox, MeloxEP, Meloxan
- L01XE05 **Nexavar**, Bayer HealthCare citostatik - inhibitor
(sorafenib) proteinkinaze
film tabl. 112 x 200mg
upotreba 2 x 400mg na 1 sat pre ili 2 sata posle jela

V08AB07 (SZ) **Optiray**, Tyco Healthcare

Rö kontrast

(joversol)

Optiray 240 rastvor za inj. 10 x (240mg joda/ml) 50ml i 100ml

Optiray 300 rastvor za inj. (špric) (300mg joda/ml) 10 x 50ml

rastvor za inj. (špric sa adapterom) (300mg joda/ml) 10 x 50ml i 75ml

rastvor za inj. (300mg joda/ml) 10 x 50ml, 75ml, 100ml, 150ml, i 200ml

rastvor za inj. (300mg joda/ml) 5 x 500ml

Optiray 320 rastvor za inj. 10 x (320mg joda/ml) 50ml, 100ml i 200ml

rastvor za inj. (špric) (320mg joda/ml) 10 x 50ml

rastvor za inj. (špric sa adapterom) (320mg joda/ml) 10 x 50ml

Optiray 350 rastvor za inj. (350mg joda/ml) 10 x 50ml, 100ml i 200ml

rastvor za inj. (350mg joda/ml) 5 x 500ml

upotreba doziranje zavisi od vrste Rö snimanja

N02BE01 (BR) **Panadol Advance**, Omega Pharma Manufacturing

(paracetamol)

analgoantipiretik

film tabl. 12 x 500mg

upotreba

odrasli: 500mg - 1g na 4 sata, prema potrebi, Max. 4g dnevno

deca (dobijaju maksimalno 4 doze u 24 sata, u razmaku od 4 - 6 sati): 1 - 4 x 250 -
500mg (6 - 12 godina)

paralele Coldrex Menthol Active, Efferalgan, Febricet, Grippostad topli napitak,
Panadol, Panadol Baby, Panaterm, Paracetamol, Paracetamol PharmaSwiss

G04CB01 **Proscar**, MSD Velika Britanija

(finasterid)

terapija hiperplazije

prostate

film tabl. 28 x 5mg

upotreba 5mg dnevno bez obzira na jelo

paralele Beneprostop, FinastEP, Finasterid PharmaS, Finasterid Sandoz, Finasterid Teva,
Finpros, Prosterid, Zerlon

A02BA02 **Ranital**, Salutas

(ranitidin)

H2 blokator

film tabl. 20 x 150mg i 300mg

upotreba

odrasli: 2 x 150mg ili 300mg odjednom uveče tokom 4 - 8 nedelja (terapija ulkusa),
150mg uveče (sprečavanje recidiva ulkusa); 2 - 3 x 150mg, Max. 6g dnevno
(Zollinger-Elisonov sindrom); 2 x 150mg ili 300mg odjednom uveče,
izuzetno 4 x 150mg, tokom 8 - 12 nedelja (reflukсни ezofagitis)

deca: 2 x 2 - 4mg/kg, Max. 300mg dnevno (ulkus)

paralele Ranisan, Ranitidin, Ranitidin PharmaSwiss, Ulcodin, Ulcogut

L01CA04 (SZ) **Vinorelsin**, Actavis Italy *citostatik - antimetotik*
(*vinorelbin*)
koncentrat za rastvor za inf. 1 x 10mg/ml i 50mg/5ml
upotreba uobičajeno: 20 - 30mg/m² nedeljno, Max. pojedinačna doza 35,4mg/m²,
ukupna Max. doza za primenu 60mg
paralele Vinorelbin "Ebewe", Vinorelbin Sandoz

N05AH03 **Zalasta**, Pharmanova *antipsihotik*
▲(*olanzapin*)
tabl. 28 x 5mg i 10mg
upotreba
odrasli: 1 x 10mg (početna doza), zatim zavisno od stanja bolesnika smanjiti na 5mg ili
povećati do Max. 20mg
paralele Olanzapin, Olanzapin PharmaS, Olanzapin Sandoz, Olanzapin-
Teva, Onzapin, Sizap, Treana, Vaira-V, Zapilex, Zyprexa Velotab

NOVA ATC KLASIFIKACIJA

J07AJ51 (Z) **Aldipete-T**, Torlak *vakcina protiv difterije, tetanusa
i velikog kašlja, adsorbovana*
(*toksoid difterije, prečišćeni + toksoid tetanusa,
prečišćeni + B. pertusis, inaktivisana*)
suspenzija za inj. im 1 i 10 x (min. 30ij + 40ij + min. 4ij)/0,5ml 5ml

D11AH02 **Elidel**, MEDA Pharma *dermatik*
Elidel, Novartis Pharma Produktions Nemačka
(*pimekrolimus*)
krem (1%) 15g

J07AJ52 (Z) **Tripacel**, Sanofi Pasteur *vakcina protiv difterije,
tetanusa i velikog kašlja*
(*toksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivisane cele ćelije*)
suspenzija za inj. im 1 x (10µg+5µg+3µg+30ij+40ij)/0,5ml
suspenzija za inj. im 5 x (10µg+5µg+3µg+30ij+40ij)/0,5ml

UKINUTI LEKOVI

Bicusan, Synton Hispania
Taxol, Bristol Myers Squibb

UKINUTI OBLICI, DOZE I PAKOVANJA

Dermodrin, Pharmazeutische Fabrik Montavit
krem (20mg/g) **50g**

Dilacor, Zdravlje
rastvor za iv inj./inf. **6 x 0,25mg/2ml**

Flavamed, Berlin-Chemie
tabl. **10 x 30mg**
oralni rastvor (15mg/5ml) **60ml**

Flosin, Berlin-Chemie
kaps. tvrda sa modifikovanim oslobađanjem **10 i 100 x 0,4mg**

Fluco Sandoz, Novartis Bangladesh
kaps. tvrda **14 x 100mg**

Fosavance, MSD Holandija
tabl. 4 x (**70mg + 2800ij**)

Gadovist, Bayer Pharma
rastvor za inj. (špric) iv 5 x (1mmol/ml) **15ml**

Hiberix, GlaxoSmithKline Belgija
prašak i rastvarač za rastvor za inj. sc im **100 x 10µg/0,5ml**

Lamect, PharmaSwiss
tabl. 30 x **200mg**

Lorista, Krka
Film tabl. 28 x **100mg**

Oglition, Zdravlje
tabl. **28 x 15mg, 30mg i 45mg**

Prexanil Combi, Les Laboratories Servier
film tabl. 30 x (**4mg + 1,25mg**)

Prexanil Combi LD, Les Laboratories Servier
film tabl. 30 x (**2mg + 0,625mg**)

Optiray, Tyco Healthcare

Optiray 300 rastvor za inj. (špric) (300mg joda/ml) 10 x 75ml

Optiray 350 rastvor za inj. (špric sa adapterom) (350mg joda/ml) 10 x 50ml, 75ml i 100ml

Videx EC, Bristol Myers Squibb

gastrorezistentna kaps. tvrda 30 x 250mg

PROMENA IMENA ILI OBLIKA LEKA I PROMENA REŽIMA IZDAVANJA

Ketoprofen Sopharma, Sopharma u **Ketoprofen IIS**, Sopharma

TramaFlash, PharmaSwiss

tabl. za oralnu suspenziju u **oralna disperzibilna tabl.**

Thiogamma 600 oral, Worwag Pharma novi režim izdavanja je **Rp**

Claritin, Schering-Plough Labo Belgija tablete i sirup – novi režim izdavanja je **BR**

ISPRAVKE

D06BB10

Aldara, 3M Health Care Limited

(*imikvimod*)

lokalni hemoterapeutik,

antivirotik

krem 12 x (5%) 250mg/kesica

upotreba *krem mazati uveče, ostaviti da deluje 6 - 10 sati, zatim oprati, primenjuje se samo kod odraslih bolesnika*

bradavice (eksterne, genitalne i perianalne): tretman primeniti 3 x nedeljno, do nestanka promena, Max. 16 nedelja

površinski karcinom bazalnih ćelija: tretman primeniti 5 x nedeljno tokom 6 nedelja

aktinične keratoze na licu ili temenu: tretman primeniti 3 x nedeljno tokom 4 nedelje, zatim praviti pauzu od 4 nedelje po ako promene nisu nestale nastaviti lečenje još 4 nedelje, Max. trajanje terapije 8 nedelja